

Số: /CD-SNN

Nam Định, ngày tháng 4 năm 2024

CÔNG ĐIỆN

Về việc tập trung chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2, rầy, bệnh khô vằn và đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa Xuân năm 2024

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT điện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Sở;
- Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và BVTV, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố và kiểm tra thực tế đồng ruộng cho thấy các trà lúa Xuân sẽ trở tập trung từ ngày 10-17/5. Trong khi đó, sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 nở rộ với mật độ rất cao, lúa sâu kéo dài, phổ biến 150-200 con/m², nơi cao 500-700 con/m², cục bộ > 1.000 con/m² (gấp 5-7 lần các năm trước, quy mô phân bố và mức độ gây hại rất nặng trên tất cả các diện tích lúa Xuân).

Rầy lúa 2 đang nở rộ và tiếp tục gia tăng mật độ đến ngày 03/5; mật độ phổ biến 500-1.000 con/m², nơi cao 3.000-5.000 con/m², cục bộ 7.000-10.000 con/m², cao gấp 2-3 lần cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, thời tiết trong thời gian tới còn có mưa xen kẽ, ẩm độ cao, biên độ nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, đây là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại, nhất là các giống nhiễm trở trước ngày 15/5, diện đã bị nhiễm bệnh đạo ôn lá và khi lúa trở gặp mưa.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố và Ban Nông nghiệp các xã/thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo bằng nhiều biện pháp, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nông dân kiểm tra giám sát đồng ruộng, theo dõi thời tiết, lựa chọn chủng loại thuốc sử dụng để phun trừ sâu, bệnh theo nguyên tắc “4 đúng”:

- Tổ chức phun trừ đồng loạt sâu cuốn lá nhỏ tập trung từ ngày 01/5 - 05/5 cho toàn bộ diện tích lúa Xuân; ưu tiên sử dụng các loại thuốc có hiệu lực cao và kéo dài như thuốc có hoạt chất Indoxacarb (Clever 150SC; 300WG, August 350WG, Obaone 95WG, Sunset 300WG, Divine 180SC, Indogold 150SC,...), hoạt chất khác (Incipio® 200SC, Solo 350SC, TT Glim 270SC, Chlorferan 240SC, Map Dona 265EC, ...). Sau 5 ngày phun thuốc, kiểm tra nếu mật độ sâu sống ≥ 50 con/m² cần phải phun lại.

- Kết hợp phun trừ rầy lúa 2 cho những diện tích có mật độ rầy ≥ 30 con/khóm (1.000 con/m²) và bệnh khô vằn khi bệnh chớm xuất hiện. Lưu ý những diện tích có mật độ rầy quá cao cần phun trước lịch phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ.

- Phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông lúc lúa trổ 3-5% số bông (*ruộng trổ trước phun trước, ruộng trổ sau phun sau*) cho các giống nhiễm như: BC15, Nếp, Khang Dân 18, TBR225, Q5, QR1, Thiên ưu 8, Đài thơm 8,... đặc biệt là trà lúa trổ bông trước ngày 15/5, những diện tích đã nhiễm bệnh đạo ôn lá và khi lúa trổ gặp mưa.

2. Phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở; tăng cường công tác điều tra, nhất là những vùng có mật độ sâu cuốn lá nhỏ, rầy cao để kịp thời hướng dẫn phun trừ, đồng thời tổ chức các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra các cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Thường xuyên theo dõi diễn biến sâu bệnh trên đồng ruộng, báo cáo kết quả phòng trừ về Sở Nông nghiệp và PTNT (*qua Chi cục Trồng trọt & BVTV*)./.

Nơi nhận:

- Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh PTK;
 - Văn phòng UBND tỉnh;
 - Cục TT, Cục BVTV;
 - Các đ/c lãnh đạo Sở;
 - Trung tâm BVTV phía Bắc;
 - Như trên;
 - Trung tâm DV NN các huyện, TP;
 - Một số đơn vị có liên quan;
 - Website Sở Nông nghiệp & PTNT;
 - Lưu: VT, Chi cục TTBVTV.
- } (để B/c)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Doãn Lâm