

Số: /CCTTBVTV-BVTV  
V/v kiểm tra, phòng trừ sâu bệnh  
hại lúa vụ Mùa 2024

Nam Định, ngày tháng 9 năm 2024

Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Nông nghiệp PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố và kiểm tra thực tế đồng ruộng: Lúa toàn tỉnh sinh trưởng phát triển tốt. Trà lúa không bị ảnh hưởng bởi ngập úng trở bông tập trung từ ngày 05-15/9; trà lúa gieo cấy lại trở tập trung từ 25/9-05/10.

Trong thời gian qua, các địa phương đã tích cực tổ chức phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 cao điểm 1 (25-30/8) cho 42.893 ha (đạt 100% diện tích cần trừ) và cao điểm 2 (02-06/9) cho 15.300 ha (đạt 92,3% diện tích cần trừ) kết hợp trừ rầy cho 27.125 ha và trừ bệnh khô vằn cho 47.312 ha lúa, đạt hiệu quả phun trừ cao. Tuy nhiên, trên một số diện tích chưa phun thuốc hoặc phun thuốc không theo nguyên tắc “4 đúng” vẫn còn có mật độ sâu sống khá cao (60-80 con/m<sup>2</sup>, cục bộ >150 con/m<sup>2</sup>). Nếu không không phun trừ kịp thời sẽ gây ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa. Dự báo sâu cuốn lá nhỏ lúa 7 sẽ nở rộ từ ngày 20-28/9 gây hại trà lúa xanh tốt trở muộn sau ngày 20/9.

Ngoài ra, nguồn sâu đục thân 2 chấm tương đương cùng kỳ năm trước, sâu non sẽ gây hại nặng trà lúa trở bông sau ngày 18/9, nơi có nguồn sâu cao.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, thời gian tới do ảnh hưởng của bão số 3 nên có nhiều ngày mưa, trùng vào giai đoạn lúa trở bông, phơi màu là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh đen lép hạt phát sinh, gây hại.

Để bảo vệ an toàn sản xuất vụ Mùa 2024, Chi cục Trồng trọt & BVTV đề nghị UBND, cơ quan chuyên môn các huyện, thành phố chỉ đạo các xã/thị trấn thực hiện tốt một số việc sau:

**1.** Tăng cường kiểm tra đồng ruộng ngay sau khi bão số 3 tan; tiếp tục phát động, hướng dẫn nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 kết hợp với trừ rầy, bệnh khô vằn trước ngày 12/9 cho những diện tích chưa phun thuốc (có mật độ sâu  $\geq 20$  con/m<sup>2</sup>) và những diện tích đã phun (có mật độ sâu sống  $\geq 50$  con/m<sup>2</sup>). Sử dụng thuốc có hoạt chất Indoxacarb (Clever 150SC; 300WG, August 350WG, Ammate<sup>®</sup>150EC, Divine 180SC,...); hoạt chất khác (Incipio<sup>®</sup> 200SC, Solo 350SC, TT Glim 270SC, Chlorin 10SC, Map Dona 265EC,...).

Phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 7 tập trung từ ngày 20-28/9 trên trà lúa trở muộn sau ngày 20/9 có mật độ sâu  $\geq 20$  con/m<sup>2</sup>.

- **Tập trung phun thuốc trừ sâu đục thân 2 chấm lúa 5** cho trà lúa trở bông sau ngày 18/9, nơi có nguồn sâu cao.

Thời điểm phun: khi lúa bắt đầu trổ (*trổ 1-5% số bông*) có mật độ ổ trứng  $\geq 0,2$  ổ/m<sup>2</sup>. Nơi có mật độ ổ trứng  $\geq 1$  ổ/m<sup>2</sup> phải trừ kếp (*lần 1 khi lúa bắt đầu trổ, lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày*). Sử dụng thuốc có hoạt chất Chlorantraniliprole (*Prevathon<sup>®</sup> 5SC, Voliam Targo 063SC,...*), hoạt chất Chlofenapyr (*Chlorferan 240SC- VUA ĐỤC THÂN,...*).

- **Phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông** lúc lúa trổ 1-5% số bông cho các giống nhiễm như: *BC15, TBR225, Đài Thom 8, Khang Dân 18, Q5, QR1, Phúc Thái 168, Nếp,...* Sử dụng thuốc có hoạt chất Tricyclazole (*Kabim 30WP, Kasai-S 92SC, Folia<sup>®</sup>525SE, Bamy 75WP, ...*); hoạt chất khác (*Bump 650WP, Bankan 600WP...*). Không nên sử dụng loại thuốc chỉ chứa 1 hoạt chất Isoprothiolane để phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông do hiệu lực phòng trừ kém.

- **Phun phòng bệnh đen lép hạt** khi lúa trổ gặp mưa. Thời điểm phun lúc lúa trổ 1-5% số bông. Sử dụng thuốc có hoạt chất Difenoconazole + Propiconazole (*Tilt super<sup>®</sup> 300EC, Tstil super 300EC, Still liver 300ME,...*); hoạt chất Azoxystrobin + Difenoconazole (*Help 400SC, Amistar top 325SC,...*); hoạt chất khác (*Tiptop 250EC, Nevo<sup>®</sup>330EC...*).

**\* Lưu ý:**

+ *Đối với bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh đen lép hạt, nếu thời điểm lúa trổ bông gặp mưa, không kịp phun thuốc cần phải phun thuốc ngay khi lúa vừa trổ bông xong.*

+ *Nếu các đối tượng dịch hại cần phòng trừ xuất hiện cùng 1 lúc có thể phối hợp các loại thuốc nhưng vẫn giữ nguyên nồng độ của mỗi loại.*

+ *Trong thời gian 4 giờ sau phun gặp mưa phải phun trừ lại.*

- **Đối với bệnh bạc lá:** Hiện nay chưa có thuốc đặc trị, vì vậy không nên phun thuốc để phòng trừ bệnh này. Nếu phát hiện bệnh cần giữ đủ nước trong ruộng, dùng ngay bón phân đạm, không phun thuốc kích thích sinh trưởng hay phân bón qua lá.

- **Đối với lúa cỏ:** Phát động nông dân cắt bỏ các bông lúa cỏ đem tiêu hủy hoặc làm thức ăn cho gia súc ở giai đoạn lúa trổ bông - ngâm sữa, tránh để hạt lúa cỏ rụng xuống đất, lây nhiễm cho vụ sau.

**2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thuốc BVTV ở các huyện, thành phố;** chỉ đạo các đại lý, hộ kinh doanh thuốc BVTV cung ứng, hướng dẫn nông dân sử dụng và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng nơi qui định./.

**Nơi nhận:**

- Cục TT, Cục BVTV, TT BVTV phía Bắc; } (để B/c)
- Lãnh đạo Sở NN&PTNT;
- VP3 UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật Sở;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Như trên;
- Đài PT-TH, Báo Nam Định;
- Website Sở NN&PTNT; Chi cục TTBVTV;
- Lưu: VT, P.BVTV.

**CHI CỤC TRƯỞNG**

**Trần Ngọc Chính**