

Số: /CCTTBVTV-BVTV
V/v tập trung phun trừ sâu bệnh cuối tháng 4
đầu tháng 5 trên lúa Xuân 2025

Nam Định, ngày tháng 4 năm 2025

Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Nông nghiệp & Môi trường các huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nam Định;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố.

Thời tiết những ngày vừa qua thuận lợi cho các trà lúa sinh trưởng, phát triển đồng thời cũng thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh gây hại. Hiện nay, trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 đang vũ hóa, mật độ phổ biến 0,1-0,3 con/m², nơi cao 1-3 con/m², cục bộ 5-7 con/m², mật độ trứng nơi cao 30-50 quả/m², cục bộ 70-100 quả/m². Mật độ trứng và sâu non sẽ gia tăng trong những ngày tới. Sâu non lúa 2 sẽ nở rộ từ ngày 01-07/5. Sâu ra rả, lúa kéo dài, mật độ sâu phổ biến 20-50 con/m², nơi cao 100-200 con/m², cục bộ >300 con/m²; mật độ sâu tương đương trung bình nhiều năm và gây hại trên diện rộng lúa đại trà. Đây là lúa sâu gây hại chính trong vụ, hại trực tiếp bộ lá đồng, nếu không phun trừ kịp thời sẽ gây thiệt hại lớn đến năng suất lúa.

Rầy lúa 2 (*chủ yếu rầy lưng trắng*) sẽ nở rộ từ 30/4-8/5, mật độ phổ biến 200-500 con/m², nơi cao 2.000-3.000 con/m², cục bộ >3.000 con/m².

Bệnh đạo ôn lá đã xuất hiện cục bộ trên giống nhiễm như Nếp, BC15, Đài thơm 8, TBR225, Bắc thơm 7..., tỷ lệ bệnh nơi cao 5-10%, cục bộ 15-20%. Mức độ gây hại cao hơn cùng kỳ năm trước. Nếu không phun trừ kịp thời sẽ gây lùn lụi lúa trong những ngày tới; đồng thời bệnh khô vằn và chuột sẽ tiếp tục bùng phát, gây hại trên diện rộng.

Để bảo vệ an toàn sản xuất vụ Xuân 2025, Chi cục Trồng trọt & BVTV đề nghị UBND, cơ quan chuyên môn các huyện, thành phố chỉ đạo các xã/thị trấn thực hiện tốt một số việc sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nông dân kiểm tra đồng ruộng, phân loại các trà lúa để có biện pháp chăm sóc bổ sung phù hợp, lưu ý không bón phân urê khi lúa ôm đồng - sắp trổ nhằm giảm thiểu sự phát sinh, gây hại của các đối tượng sâu bệnh cuối vụ, nhất là bệnh bạc lá trong điều kiện gặp mưa to, gió lớn...

2. Tổ chức đợt cao điểm phun trừ dịch hại:

- **Tiếp tục phun trừ bệnh đạo ôn lá** khi chớm xuất hiện và diện tích đã phun nhưng vẫn còn vết bệnh cấp tính.

Phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông lúc lúa trổ 3-5% số bông (*ruộng trổ trước phun trước, ruộng trổ sau phun sau*) cho các giống nhiễm như: BC15, Nếp, Khang Dân 18, TBR225, QR1, Q5, Thiên ưu 8, Đài thơm 8, Phúc Thái 168... đặc biệt là trà lúa trổ bông trước ngày 15/5; những diện tích đã nhiễm bệnh đạo ôn lá và khi lúa trổ gặp mưa.

Sử dụng thuốc có hoạt chất Tricyclazole (*Kabim 30WP, Kasai-S 92SC, Folia[®]525SE, Map Unique 750WP, Bamy 75WP, Angate 75WP, Beam[®]75WP, Flash 75WP,...*); hoạt chất khác (*Bankan 600WP, Bemgold 750 WP,...*). Không nên sử dụng loại thuốc chỉ chứa 1 hoạt chất Isoprothiolane để phun phòng bệnh đạo ôn do hiệu lực phòng trừ kém.

- **Phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2** tập trung từ ngày 01 - 07/5 cho những diện tích lúa có mật độ sâu ≥ 20 con/m² (*Trà lúa cấy sớm phun đầu lịch, trà lúa gieo cấy muộn phun cuối lịch phòng trừ*). Sử dụng thuốc có hoạt chất Indoxacarb (*Clever 150SC; 300WG, August 350WG, TT Bite[®]30SC, Obaone 95WG, Sunset 300WG, Divine 180SC, Indogold 150SC,...*); hoạt chất khác (*Chlorin 10SC, Solo 350SC, Ammate 150EC, TT Glim 270SC, Chlorferan 240SC, Map Dona 265EC, ...*). Sau 5 ngày phun thuốc, kiểm tra nếu mật độ sâu còn sống ≥ 50 con/m² cần phải phun lại.

- **Kết hợp phun trừ rầy lúa 2** cho những diện tích có mật độ rầy ≥ 30 con/khóm (1.000 con/m²). Sử dụng thuốc có hoạt chất Nitenpyram, Pymetrozin (*Titan 600WG, TT Led[®] 70WG, Vuachest 800WG, Chess[®] 50WG, Palano 600WP, Chatot 600WG, TVpymeda 350WP,...*), hoạt chất khác (*Amira 25WP, Midan 10WP, Sectox 100WP, ...*). Sau 3 ngày phun thuốc, nếu mật độ rầy còn trên 30 con/khóm (1.000 con/m²) phải phun lại.

- **Phun trừ bệnh khô vằn** cho những diện tích bệnh chớm xuất hiện. Sử dụng thuốc có hoạt chất Pencycuron (*Moren 25WP,...*), hoạt chất Hexaconazole (*Anvil[®] 5SC, Chevin 5SC, Lervil 100SC, Shut 677WP, A-V-T Vil 5SC,...*), hoạt chất khác (*Amistar top[®] 325SC, Map Unique 750WP, Validacin 5SL, Nevo[®] 330EC,...*).

* Lưu ý: Nếu các đối tượng dịch hại cần phòng trừ xuất hiện cùng 1 lúc có thể phối hợp các loại thuốc nhưng vẫn giữ nguyên nồng độ của mỗi loại. Trong thời gian 4 giờ sau phun gặp mưa phải phun trừ lại.

- **Đối với Lúa cỏ:** Phát động nông dân nhổ bỏ lúa cỏ, cắt bỏ những bông lúa cỏ từ giai đoạn lúa làm đòng - ngâm sữa đem tiêu hủy hoặc làm thức ăn cho gia súc; không vứt bỏ lúa cỏ trên ruộng, bờ ruộng, kênh mương, tránh để hạt cỏ rụng xuống đất, lây nhiễm cho vụ sau.

- **Đối với chuột:** Tích cực tiêu diệt bằng biện pháp thủ công như đào bắt kết hợp với các loại bẫy. Nghiêm cấm việc dùng điện và các biện pháp dễ gây nguy hiểm cho người, vật nuôi để diệt chuột, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quảng cáo, buôn bán thuốc BVTV ở các huyện, thành phố; chỉ đạo các đại lý, hộ kinh doanh thuốc BVTV cung ứng và hướng dẫn nông dân sử dụng và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng nơi qui định./.

Nơi nhận:

- Cục TT và BVTV; TT BVTV phía Bắc;
- Lãnh đạo Sở NN và Môi trường;
- VP3 UBND tỉnh;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Như trên;
- Báo Nam Định; Thông tấn xã VN;
- Website Sở NN và MT, Chi cục TTBVTV;
- Lưu: VT, P. BVTV.

CHI CỤC TRƯỞNG

Trần Ngọc Chính